






ばね指（弾発指）

● 症状と原因 ●


指には腱（けん）というヒモがあり、それによって指の曲げ伸ばしをすることができます。さらに屈筋腱には、腱の浮き上がりを押さえる靭帯性腱鞘（じんたいせいけんきょう）というトンネルがあります。



屈筋腱と靭帯性腱鞘の間で炎症が起こると、指の付け根に痛み、腫れ、熱感が生じます。これを腱鞘炎と呼び、進行するとはね現象が生じます。これがばね指です。




主に妊娠時、産後や更年期の女性に起こることが多く、



右手の母指に最も多く発生します。

●病態●


腱鞘と腱が引っかかるようになるのは、指の使いすぎによる刺激のため腱鞘が肥厚したり、腱が肥大硬化したりして、そのために一層刺激が強くなるといった悪循環を生じるためだと考えられています。




●治療●

①保存的療法：


- (1) 局所の安静で刺激を少なくしましょう。時には副木を当てて固定することがあります。



- (2) 腱鞘内に局麻剤入りステロイド注射をして、症状を押さえます。



②手術療法：①の方法で治らないときや曲がったまま動かないときなどに行います。



監修

日本手の外科学会広報委員会



制作

エーザイ株式会社

CODE MB(1)217

1997年1月作 成

2005年8月第14刷